

RÈGLES DE DÉPISTAGE / DIAGNOSTIC DU COVID-19 PAR PCR ET MISE EN ŒUVRE DES PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES D'HYGIÈNE POUR LES PATIENTS

Cette procédure est adaptée aux données épidémiologiques actuelles
(taux d'incidence, nombre de patients hospitalisés en Réanimation).

ADMISSION / EN COURS D'HOSPITALISATION / INTERVENTION CHIRURGICALE

Patient asymptomatique : Pas de PCR sauf si contact avec un cas avéré (tester entre J2 et J4 après dernier contact)

Patient symptomatique : PCR recommandée + recherche d'autres virus respiratoires selon contexte clinique et épidémique

NB : Il n'est pas licite de récuser un patient sur le seul argumentaire d'un test COVID positif ou sur l'absence de test COVID.

TRANSFERT SSR / SLD / EHPAD

Patient asymptomatique : Pas de PCR sauf si circulation/ cluster dans le service d'amont

Patient symptomatique : Faire PCR, si positif, confère délai de transfert dans tableau ci-dessous

SUIVI DE L'ÉLIMINATION VIRALE / CONTAGIOSITÉ

Que le patient soit symptomatique ou pas, pas de suivi par PCR (sauf cas particulier du patient immunodéprimé symptomatique avec lymphopénie B et/ou traité par anti-CD20 qui reste symptomatique à 3 semaines : contacter infectiologue tél 1000).

Le délai avant transfert et la durée des précautions COVID sont dictés par la forme clinique et l'état immunitaire du patient : il n'est pas nécessaire de réitérer les tests PCR.

Tableau clinique	Délai avant transfert	Durée précautions COVID
COVID-19 asymptomatique ou pauci-symptomatique	aucun	7 jours
COVID-19 symptomatique non immunodéprimé	7 jours	14 jours
COVID-19 après Réa ou chez un immunodéprimé	9 jours	21 jours

CAT EN CAS DE CLUSTER (AU MOINS 5 CAS EN 4J)

Appeler l'EMPRI au 7687.

Réaliser un dépistage par PCR à J0 des patients ayant eu un contact à risque (ex : partage de repas, animation collective...)

- Si pas de nouveaux cas, renouveler les dépistages par PCR entre J2 et J4. Si absence de nouveaux cas => arrêt des dépistages
- Si présence de nouveaux cas, renouveler les dépistages par PCR entre J7 et J14

NB : Il est recommandé de dépister le personnel soignant à J0 puis à J7 s'il y a des nouveaux cas.

<https://www.sf2h.net/publications/recommandations-relatives-aux-indications-du-diagnostic-de-la-covid-19>

