

# PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EN FONCTION DU GESTE POUR PATIENT SUSPECT OU CONFIRMÉ COVID-19

GESTE	MASQUE	LUNETTES OU VISIÈRE	SUR-BLOUSE <sup>2</sup>	TABLIER PLASTIQUE À USAGE UNIQUE	GANTS À USAGE UNIQUE <sup>1</sup>
<b>Pas de contact patient / résident :</b> • Distribution des repas • Distribution des médicaments	Chirurgical	✓	✗	✗	✗
<b>Pas de contact patient / résident mais contact avec produits d'entretien :</b> • Entretien Chambre	Chirurgical	✓	✗	✓	✓
<b>Contact patient / résident mais SANS risque d'exposition aux liquides biologiques :</b> • Lever / Mise au fauteuil • Retournement • Conduite aux toilettes • Prises de constantes • -Brancardage	Chirurgical	✓	✗	✓	✗
<b>Contact ET risque d'exposition aux liquides biologiques :</b> • Aide à la prise de repas • Mettre ou enlever une prothèse dentaire • Soin de bouche • Change / Toilette • Prise de sang • Vomissements • Funérarium	Chirurgical	✓	✗	✓	✓
<b>Geste à risque d'aérosolisation :</b> • Prélèvement nasopharyngé • Intubation • Lavage broncho-alvéolaire • Soin de trachéotomie • Oxygénothérapie à haut débit (> 6 litres/mn) • Kiné respiratoire générant des aérosols • Aspiration • VNI • Fibroscopie • Aérosol • Personnel à risque de forme grave sur indications du cadre de service	FFP2	✓	✓	✗	✓

1. Prolongation du port de la sur-blouse par le même soignant pour plusieurs patients COVID-19 sous conditions (*étanchéité, intégrité, ne pas la toucher ni la porter hors zones de soins*) et si le patient n'est pas porteur de BMR ou de Clostridium difficile. Changer le tablier plastique à usage unique entre chaque patient
2. Pas de port systématique de gants (*les gants sont indiqués lors de risque de piqure, coupure, blessure ou contact avec des liquides biologiques*), car risque important de contamination de l'environnement (*poignées de porte, interrupteurs...*). Réaliser une friction hydroalcoolique : à la sortie de la chambre, IMPÉRATIVEMENT AVANT de mettre des gants ET APRÈS leur retrait, après le retrait des équipements de protection (*sur-blouse, tablier, masque*) et AVANT de toucher son visage

Bibliographie : Note du 02/06/22 Société Française d'Hygiène Hospitalière relative à la protection des patients et des professionnels en contexte Covid-19.

Tribune du 17/01/22 du journal "Le Monde" : Société Française d'Hygiène Hospitalière : "Le masque FFP2 n'est pas la solution de protection absolue contre le SARS-COV-2."

MAJ DÉCEMBRE 2022

CELLULE DE COORDINATION COVID-19

Centre Hospitalier de Béziers - 2 rue Valentin Haüy 34500 Béziers  
qualite@ch-beziers.fr - www.ch-beziers.fr



suivez-nous sur :

